



Hazırlayan: Dr. H. Savaş Göktürk

Non-sirotik Kronik Hepatit B hastalarında Entekavir veya Tenofovir kullanımının sonlandırılması sonrası relaps oranları

Kuo M-T, Hu T-H, Hung C-H, et al.

Hepatitis B virus relapse rates in chronic hepatitis B patients who discontinue either entecavir or tenofovir. *Aliment Pharmacol Ther.* 2019;49:218–228.

<https://doi.org/10.1111/apt.15053>

ETV kullanan 342 ve TDF kullanan 165 non-sirotik Hepatit B hastasının tedavi sonlandırıldıktan sonra en az 6 ay takip edildiği bu çalışmaya göre: TDF kullananlarda, ETV kullananlara göre, relaps hem daha erken hem de daha şiddetli olmaktadır.

Hazırlayan: H. Savaş Göktürk

Plazma D-Dimer düzeyi, HCC ilişkili portal ven trombozu için hem tanısal hem de prognostik bir belirteçtir

D-dimer plasmatic levels as a marker for diagnosis and prognosis of hepatocellular carcinoma patients with portal vein thrombosis *Clinical and Experimental Gastroenterology* — Malaguarnera M, et al. | December 10, 2018

DOI <https://doi.org/10.2147/CEG.S172663>

İtalya'da yapılan ve 118 HCC+PVT ve 50 HCC (PVT yok) hastasını içeren çalışmanın sonucuna göre: Plazma D-Dimer düzeyi gerek tanısal gerek de prognostik olarak anlamlı farklılık göstermektedir.

Bu bülten Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) tarafından, bilimsel gelişime katkı amacı ile hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır. Makalelerin içeriklerinin tıbbi ve hukuki sorumluluğu ilgili yazar ve yayınevlerine aittir. Paylaşılması istenen güncel makalelerin, formata uygun bir şekilde dernek e-posta adresine (tasl@tasl.org.tr) yollanması gerekmektedir.

TKAD adına sahibi: Ramazan İdilman (Başkan)

Bülten editörü: Arif Mansur Coşar